



IIEF 5

Data 30 giugno 2000
Categoria andrologia

(Questionario per la valutazione del deficit erettile. Appendice all' articolo riportato nelle Pillole)

Domanda

- Quanto spesso e’ stato capace di avere un’erezione durante l’attivit’a sessuale?
R.

0: non ho avuto nessuna attivita’ sessuale;

1: quasi mai o mai

2: poche volte (meno della meta’)

3: qualche volta (meta’ delle volte)

4: la maggioranza delle volte

5: sempre o quasi

Dopo lo stimolo sessuale ha raggiunto un’erezione sufficiente per la penetrazione?

0: nessuna attivita’ sessuale

1: quasi mai o mai

2: poche volte (meno della meta’)

3: qualche volta (meta’ delle volte)

4: la maggioranza delle volte

5: sempre o quasi

Quando ha tentato un approccio sessuale, quanto spesso e’ stato capace di penetrare la sua partner?

0: non ho tentato nessun approccio

1: quasi mai o mai

2: poche volte (meno della meta’)

3: qualche volta (meta’ delle volte)

4: la maggioranza delle volte

5: sempre o quasi

Durante il rapporto sessuale quanto spesso e’ stato capace di mantenere l’erezione dopo che ha penetrato la partner?

0: non ho tentato nessun approccio

1: quasi mai o mai

2: poche volte (meno della meta’)

3: qualche volta (meta’ delle volte)

4: la maggioranza delle volte

5: sempre o quasi

Durante il rapporto sessuale quanto difficile e’ stato mantenere l’erezione fino alla fine del rapporto?

0: non ho tentato nessun approccio

1: estremamente difficile

2: molto difficile

3: difficile

4: un po’ difficile

5: non difficile

Come valuterebbe il suo livello di fiducia per poter raggiungere e mantenere un’erezione?

1: molto bassa

2: bassa

3: modesta

4: alta

5: molto alta

Allegato 2.: Domande aggiuntive sulla disfunzione erettile.

Ha erezioni spontanee al risveglio?



PILLOLE.ORG



Ha osservato noduli o parti indurite toccando il pene?
’erezione si accompagna a dolore o incurvamento?
("Il Diabete" vol.12 n.1 Marzo 2000)