



Alcuni antiipertensivi possono essere dannosi nel diabete di tipo 2

Data 30 dicembre 2000
Categoria metabolismo

Precedenti studi hanno avanzato la possibilità che alcuni farmaci antiipertensivi (diuretici diazitici, ace-inibitori, calcio-antagonisti, beta-bloccanti) possono avere un ruolo nell'eziopatogenesi del diabete di tipo 2. E' stato effettuato uno studio prospettico su oltre 12 mila adulti non diabetici seguiti per sei anni. Sono stati corretti i fattori associati confondenti (eta, peso corporeo, etnia) ed è stata studiata l'incidenza del diabete associata alle varie terapie antiipertensive. È stato rilevato che nei calcio-antagonisti ne gli ace-inibitori ne; i diuretici tiazidici apparivano collegati a un aumento di incidenza del diabete. Al contrario assunzione di beta-bloccanti era associata ad un aumento di rischio di insorgenza di ridotta tolleranza al glucosio del 28% nei sei anni successivi all'inizio della terapia. Questo dato impone una attenta verifica della scelta dell'antiipertensivo ideale in soggetti a rischio di diabete, pur tenendo conto che i beta-bloccanti, per la loro azione favorevole su certi aspetti cardiovascolari, possono ugualmente costituire farmaci di prima scelta in svariate condizioni cliniche. E' necessaria però; una attenta sorveglianza dal punto di vista diabetologico di questi pazienti.

Daniele Zamperini. Fonte: T.V. Gres N.E.J.M. 2000;342:905-12