



## Nuove linee guida per lo screening del cancro del Colon

---

**Data** 27 luglio 2001  
**Categoria** oncologia

---

L'American Medical Association ha diffuso le nuove linee guida per lo screening del cancro del colon/retto. Il Cancro del colon retto è negli USA il terzo cancro per frequenza sia nelle donne che negli uomini. Nonostante l'evidenza della utilità della diagnosi precoce e nonostante l'evidente riduzione della mortalità legata alla diagnosi precoce una percentuale troppo esigua della popolazione si sottopone allo screening mediante ricerca del sangue occulto e colonscopia. Essendo noto che il cancro del Colon è caratterizzato da una lunga fase preclinica che il più delle volte inizia con polipi adenomatosi la cui asportazione previene la trasformazione cancerosa non bisogna sottovalutare l'importanza dello screening.

**Raccomandazioni:** Tutti i soggetti di età maggiore o uguale a 50 anni, asintomatici e senza altri fattori di rischio devono essere screenati con :

Ricerca del sangue occulto nelle feci annuale e/o colonscopia ogni 5 anni o

Colonscopia ogni 10 anni o

Clisma opaco con doppio mezzo di contrasto ogni 5-10 anni

Sorveglianza per soggetti ad alto rischio con colonscopia ad intervalli personalizzati per età, rischio, comorbidità è giustificata:

In caso di storia personale di cancro coloretale o di polipi adenomatosi

In caso di familiarità per cancro del colon/retto o polipi in familiari di I grado

In caso di malattie infiammatorie dell'intestino come Colite Ulcerosa e Morbo di Crohn

Fonte: American Medical Association