



## HBV DNA predice cirrosi

---

**Data** 21 giugno 2005  
**Categoria** epatologia

---

I livelli di HBV DNA possono predire l'incidenza di cirrosi epatica in pazienti con infezione da epatite B.

---

Uno studio statunitense presentato nel corso della settimana di studio Digestive Disease Week tenutasi nell'Illinois ha preso in esame la correlazione tra i livelli di HBV DNA e l'incidenza di cirrosi epatica in pazienti con infezione da epatite B.

Lo studio ha esaminato un campione di 3.851 soggetti abitanti in Taiwan infetti dal virus dell'epatite B nel biennio 1991/1992. Sono stati valutati i livelli sierici di HBV DNA ed i pazienti sono stati sottoposti a ultrasonografia per la diagnosi della cirrosi. E' stato inoltre calcolato il tasso di incidenza della cirrosi per ogni soggetto preso in esame nell'arco di un anno.

Nell'arco di 6 mesi una cirrosi è stata diagnosticata a 75 dei 851 soggetti esaminati. I livelli HBV DNA sono risultati degli importanti predittori di cirrosi. L'incidenza della cirrosi è risultata aumentata con i livelli di HBV DNA in maniera indipendente da altre variabili.

Fonte: MFL Comunicazione (06/06/2005)