

## ASA causa di un terzo delle morti da tossicità gastroenterica dei FANS

09 settembre 2005 Data Categoria gastroenterologia

La mortalità da tossicità gastroenterica da antinfiammatori è intorno a 15 ogni 100.000 consumatori di FANS e per un terzo la responsabile è l'ASA a basse dosi.

Due ampi studi su dati del 2001 sono stati realizzati in Spagna sulle complicanze gastroenteriche dei FANS. L'incidenza di ricovero per eventi G-l maggiori è risultata di 121.9 eventi/100,000/anno e quelli riguardanti il tratto G-l superiore sono stati 6 volte più frequenti rispetto a quelli del tratto inferiore. IL tasso di mortalità è risultato del 5.57% (95% CI = 4,9–6,7), e 5,62% (95% CI = 4,8–6,8), rispettivamente nel primo e secondo studio. Il tasso di mortalità attribuibile all'uso di FANS/ASA oscilla tra 21 e 24,8 casi/milione, o 15,3 morti/100000 trattati con FANS/ASA. Fino ad un terzo delle morti da FANS può essere attribuito all'utilizzo di basse dosi di aspirina.

Fonte: Am J Gastroenterol 2005;100:1685-1693

doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1111/j.1572-0241.2005.41833.x" target="\_parent">10.1111/j.1572-0241.2005.41833.x"