DHEA utile nella displasia cervicale

Data 30 dicembre 2003
Categoria ginecologia

Regressione della displasia della cervice di basso grado dopo somministrazione intravaginale di DHEA

Il Deidroepiandrosterone (DHEA) è un ormone che ha dimostrato di possedere un'attività modulatrice del sistema immunitario ed inibitoria sul tumore.
Uno studio pilota, compiuto presso il Massachussets General Hospital di Boston, ha esaminato la sicurezza e l'efficacia del DHEA, somministrato per via intravaginale, nelle donne con displasia cervicale a basso grado.
A 12 donne sono stati somministrati 150 mg di DHEA micronizzato per via intravaginale al giorno, per 6 mesi.
Al termine dello studio l'83% (10/12) delle donne non presentava più displasia. Le rimanenti 2 donne avevano normali esami colposcopici ma l'esame citologico ha mostrato la presenza di cellule atipiche di significato non definito.
Non sono stati osservati effetti indesiderati.
Gli incoraggianti risultati dello studio necessitano tuttavia di conferma.

Gynecol Obstet Invest 2003; 55:25-31

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 14/11/2026 alle ore 4:24 | Pagina 1 di 1