



---

## Glitazoni e rischio di insufficienza cardiaca congestizia

---

**Data** 01 febbraio 2004  
**Categoria** cardiovascolare

---

Terapie antidiabetiche e possibile interferenza negativa con l'apparato cardiovascolare

---

Una dichiarazione congiunta dell'American Heart Association ( AHA ) e dell'American Diabetes Association ( ADA ) raccomanda di non prescrivere i glitazoni , anche conosciuti come tiazolidinedioni, nei pazienti a rischio di insufficienza cardiaca congestizia.

I glitazoni attualmente in commercio sono: Pioglitazone e Rosiglitazone .

Alcuni pazienti che assumono i glitazoni manifestano edemi e segni di scompenso.

I glitazoni non dovrebbero essere prescritti a pazienti con malattia coronarica avanzata , o grave insufficienza cardiaca.

Nei pazienti con ridotta frazione d'eiezione, ma senza sintomi di insufficienza cardiaca congestizia, i glitazoni dovrebbero essere prescritti solo se il controllo glicemico non venga raggiunto con altri farmaci , e a bassi dosaggi iniziali.

I pazienti con aumento del peso corporeo superiore a 3 kg , insorgenza improvvisa di edema ai piedi , dispnea o senso di stanchezza , dovrebbero avvertire immediatamente il loro medico curante.

Circulation 2003; 108 :2941-2948