

Servono i fluidi e i diuretici nella colica renale?

Data 31 gennaio 2007 Categoria clinical_queries

Non ci sono per il momento evidenze di buona qualità che i fluidi e i diuretici siano utili nella colica renale acuta.

E' prassi consolidata, nel paziente con colica renale acuta non complicata, consigliare un abbondante introito di liquidi al fine di aumentare la diuresi e facilitare in tal modo l'espulsione del calcolo. Altresì nei pazienti ospedalizzati o in Pronto Soccorso spesso si infondono liquidi per via venosa e/o si somministrano diuretici con la stessa finalità. Tuttavia una revisione Cochrane ha permesso di ritrovare solo un RCT (con appena 60 partecipanti) in cui i pazienti

Tuttavia una revisione Cochrane ha permesso di ritrovare solo un RCT (con appena 60 partecipanti) in cui i pazienti sono stati randomizzati alla somministrazione di fluidi per via venosa per un periodo di 6 ore oppure alla non sommistrazione difluidi.

Non si riscontrarono differenze tra i due gruppi per quanto riguarda l'intensità del dolore alla sesta ora e per altri outcomes (rimozione chirurgica del calcolo o necessità di cistoscopia).

Date le prèmesse fisiopatologiche che fanno ritenere ragionevolmente utili le misure atte ad aumentare la diuresi, non rimane che concludere come i revisori della Cochrane, auspicando studi adeguati per valutare l'efficacia e la sicurezza dei fluidi e dei diuretici nella colica reno-ureterale.

RenatoRossi

Fonte

Worster A, Richards C. Fluids and diuretics for acute ureteric colic. http://www.cochrane.org/reviews/en/ab004926.htm]. Accesso del 29 settembre 2006.