



Acido acetilsalicilico e FANS in gravidanza

Data 06 dicembre 2006
Categoria professione

Modificata l'AIC dell'acido acetilsalicilico e dei FANS per quanto al loro uso durante la gravidanza.

Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 29.11.06, Gazzetta Ufficiale n. 283 del 05.12.06

Con questo provvedimento vengono modificati gli stampati dei medicinali contenenti acido acetilsalicilico e FANS (compresi gli inibitori selettivi delle COX-2) per quanto riguarda il loro uso durante la gravidanza. Il provvedimento è articolato, ma le conclusioni possono essere così riassunte:

- dosi di acido acetilsalicilico fino a 100 mg/die possono essere considerate sicure limitatamente ad un impiego in ambito ostetrico, che richiede un monitoraggio specialistico;
- durante il 1° e 2° trimestre di gravidanza l'acido acetilsalicilico non deve essere somministrato se non in casi strettamente necessari; se esso è usato da una donna in attesa di concepimento, o durante il 1° e 2° trimestre di gravidanza, la dose e la durata del trattamento devono essere mantenute le più basse possibili;
- l'acido acetilsalicilico a dosi superiori a 100 mg/die è controindicato durante il 3° trimestre di gravidanza;
- I FANS devono essere somministrati solo in casi strettamente necessari nella donna in attesa di concepimento o durante il 1° e 2° trimestre di gravidanza, e la dose e la durata del trattamento devono essere mantenute le più basse possibili;
- I FANS sono controindicati durante il 3° trimestre di gravidanza.

 [vai a medico e leggi](http://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia2006/19214pillole.htm)