



---

## Obesità e bendaggio gastrico (1)

---

**Data** 01 febbraio 2003  
**Categoria** gastroenterologia

---

I pazienti sottoposti a bendaggio gastrico perdono in media metà del loro peso nell'arco di 2 anni.

---

Il bendaggio gastrico consiste nel mettere una "cintura" intorno al corpo dello stomaco in modo da formare una tasca prossimale che, funzionando da "stomaco", riduce il volume disponibile per l'introduzione di alimenti.

Mediante un catetere connesso con un port sottocutaneo, si può iniettare o aspirare fluido nel bendaggio, chiudendo o aprendo lo stomaco così formato tra la tasca superiore e il resto dello stomaco.

In questo lavoro vengono presi in esame i risultati concernenti 500 pazienti in cui è stato inserito il dispositivo "Lap band".

Non si osservarono morti perioperatorie.

La complicanza maggiore più comune fu la perforazione gastrica (4 pazienti).

Altre complicazioni, osservate in 80 pazienti, furono costituite da scivolamento della banda e disfunzione del dispositivo di regolazione della larghezza dello stomaco.

52 pazienti (circa il 10%) furono rioperati per correggere complicanze di questo tipo.

I pazienti operati persero in media metà del loro peso nell'arco di 2 anni.

Fonte: Ann Surg 2003 Jan; 237: 1-9