



Rosiglitazone associato ad aumento del rischio di frattura nelle donne.

Data 14 marzo 2007
Categoria professione

Nuove informazioni di sicurezza inerenti l'aumentata incidenza di fratture nelle pazienti di sesso femminile in seguito a trattamento a lungo termine con rosiglitazone maleato.

In seguito ad una revisione dei dati di sicurezza provenienti dallo studio clinico ADOPT (A Diabetes Outcome and Progression Trial) e riguardanti le specialità medicinali contenenti rosiglitazone è emerso che le pazienti di sesso femminile trattate con tale principio attivo sono andate incontro ad un aumento significativo di fratture del piede, della mano e del braccio, rispetto alle pazienti trattate con metformina e glibenclamide. Il meccanismo relativo all'aumento di fratture è incerto. Il rischio di fratture deve essere tenuto sotto controllo nella gestione di pazienti, specialmente di sesso femminile, che sono attualmente trattati o in quelli per i quali si stia valutando l'inizio di un trattamento con rosiglitazone.

Recentemente la FDA ha evidenziato un'associazione con il rischio fratturativo anche per il pioglitazone
<http://www.fda.gov/medwatch/safety/2007/safety07.htm#actos>.

Fonte: Aifa - 13/03/2007