



## Diabete e rischio di malattia epatica cronica e di carcinoma epatocellulare

---

**Data** 27 giugno 2004  
**Categoria** gastroenterologia

---

Uno studio coordinato da Ricercatori dello Houston Veterans Affairs Medical Center ha valutato l'associazione tra il diabete e la malattia epatica cronica. Sono stati identificati tutti i pazienti che tra il 1985 e il 1990 sono stati dimessi dall'ospedale con una diagnosi di diabete. Questi pazienti sono stati seguiti fino al 2000. Sono stati esclusi i soggetti affetti da concomitante malattia epatica.

---

I soggetti presi in esame sono stati 173.643 con diabete e 650.620 senza diabete.

La maggior parte ( 98% ) era di sesso maschile e quelli affetti da diabete erano più anziani rispetto a quelli senza diabete ( 62 versus 54 anni ). L'incidenza di malattia epatica cronica non-alcolica è risultata molto più alta tra i pazienti diabetici ( 18.13 contro 9.55, rispettivamente, per 10.000 persone-anno ). Simili risultati sono stati ottenuti per il carcinoma epatocellulare ( 2.39 contro 0.87, rispettivamente, per 10.000 persone-età ). Il diabete era associato ad un indice di rischio ( hazard rate ratio , HRR ) di 1.98 per la malattia epatica cronica non-alcolica e di 2.16 per il carcinoma epatocellulare. I pazienti con diabete da più di 10 anni presentavano il massimo rischio.

Questo studio ha dimostrato che tra gli uomini affetti da diabete il rischio di malattia epatica cronica non-alcolica e di carcinoma epatocellulare è raddoppiato

Fonte: Gastroenterology 2004; 126: 460