



Terapia adiuvante con goserelin per il tumore della mammella in premenopausa (2)

Data 30 marzo 2003
Categoria oncologia

In questo studio sono state selezionate 1000 donne affette da neoplasia mammaria con linfonodi positivi e negativi all'esame biotico. Tutte le neoplasie presentavano positività per i recettori per estrogeni. Dopo l'intervento chirurgico seguito o meno da radioterapia, le pazienti furono randomizzate per essere trattate con goserelin per 3 anni e in seguito tamoxifene per 5 anni, contro 6 cicli di polichemioterapia CMF (Ciclofosfamide, Metrotexate, Fluorouracile). Durante un follow-up medio di 5 anni la sopravvivenza libera da malattia fu significativamente superiore nel gruppo trattato con goserelin e tamoxifene (81% contro 76%). Fu rilevato inoltre un trend non significativo verso una migliore sopravvivenza nel gruppo trattato con goserelin e tamoxifene.

Jakesz R et al

Randomized adjuvant trial of tamoxifen and goserelin versus cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil: Evidence for the superiority of treatment with endocrine blockade in premenopausal patients with hormone responsive breast cancer – Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group Trial 5.