ASPETTI PSICOSESSUALI DEL TRATTAMENTO DELL'IPB

Data 30 marzo 1998
Categoria urologia

Gli Autori hanno diviso in due gruppi 88 pazienti affetti da IPB, 65 sono stati trattati chirurgicamente (TURP) e 23 con terapia medica (mepartricina). Tutti sono stati sottoposti ad una serie di test (prima del trattamento, dopo 6 e dopo 12 mesi) finalizzati a valutare l'efficienza sessuale (GSTS, SSES-E, SHF, SHF-A). L'analisi multivariata dei dati evidenziava che il comportamento sessuale degli operati non differiva in maniera significativa da quello dei soggetti trattati con terapia medica. Ambedue i gruppi hanno mostrato un modesto ma parallelo deterioramento nel tempo, attribuibile forse all'età abbastanza avanzata del campione. Unico parametro significativamente diverso era quello dell'eiaculazione retrograda, significativamente maggiore nel gruppo operato con TURP. Il tutto in accordo con la maggior parte della letteratura.
Fonte: Sampalmieri, Giordano - Riv. Sessuol. vol. 21 n. 3

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 7/11/2026 alle ore 10:23 | Pagina 1 di 1