

## FANS, PARACETAMOLO E DIVERTICOLI

Data 30 maggio 1998 Categoria gastroenterologia

Uno studio prospettico della durata di 4 anni ha indagato la relazione tra il consumo regolare di FANS e Paracetamolo e il rischio di malattia diverticolare sintomatica. I soggetti, 35.615 maschi professionisti sanitari (dentisti, medici, farmacisti, veterinari ecc.) di età tra i 40 e i 75 anni, sono stati indagati mediante un questionario con cadenza biennale nel 1988, 1990 e 1992. Alla data del 1988 erano tutti esenti da malattia diverticolare, poliposi del colon o del retto, colite ulcerosa e cancro. RISULTATI: durante il periodo di quattro anni sono stati documentati 310 nuovi casi di malattia diverticolare sintomatica. Dopo aggiustamento per età, attività fisica, consumo di fibre e di grassi, l'uso regolare e consistente di FANS e Paracetamolo è stato associato positivamente col rischio complessivo di malattia diverticolare sintomatica: per i FANS, rischio relativo = 2,24 (consumatori vs. non consumatori); per il Paracetamolo, rischio relativo di 1,81. Gran parte di questa associazione positiva era attribuibile a casi con emorragia, particolarmente per il Paracetamolo (per i FANS, rischio relativo = 4,64; per il Paracetamolo, rischio relativo = 13,63). CONCLUSIONI: I risultati suggeriscono che il consumo regolare e consistente di FANS e Paracetamolo è associato con sintomi di malattia diverticolare severa, in particolare l'emorragia.

Fonte: Archives of Family Medicine, 05-06/98