



## Metformina e funzione renale

**Data** 18 dicembre 2016  
**Categoria** metabolismo

La FDA ha emanato alcune raccomandazioni sull'uso della metformina in rapporto alla funzionalità renale.

La metformina è uno dei farmaci antidiabetici più prescritti, ma non può essere usata nei soggetti con importante compromissione della funzionalità renale.

Il problema è particolarmente sentito negli anziani perchè in essi spesso la funzione renale è deficitaria.

La FDA ha pubblicato alcune precisazioni per guidare i medici nella prescrizione della metformina in pazienti con ridotta funzione renale. La ragione di questa posizione è dovuta al fatto che, secondo la FDA, la metformina può essere sicura in soggetti con riduzione lieve o moderata della funzionalità renale.

Di seguito riportiamo le principali raccomandazioni dell'ente regolatore americano.

- 1) Misurare il volume del filtrato glomerulare (VFG) prima di prescrivere il farmaco, che è controindicato nel caso di VFG inferiore a 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>.
- 2) Non è consigliato iniziare la metformina per valori di VFG compresi tra 30 e 45 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>; se durante il trattamento il VFG scende a valori compresi tra 30 e 45 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> valutare attentamente il rapporto rischio beneficio della continuazione della terapia.
- 3) Nei pazienti trattati con metformina misurare il VFG almeno ogni anno.
- 4) Nei pazienti a rischio di compromissione renale si consiglia di monitorare più frequentemente il VFG; questa strategia è raccomandata soprattutto negli anziani
- 5) Se il paziente deve eseguire un esame radiologico con mezzo di contrasto iodato si consiglia di sospendere il trattamento:
  - VFG uguale o inferiore a 60 ml/min/1.73 m<sup>2</sup>
  - coesiste epatopatia, alcolismo, scompenso cardiacoSi consiglia la sospensione del trattamento anche nel paziente che deve effettuare un esame con mezzo di contrasto iodato somministrato per via arteriosa.  
Se dopo 48 ore dall'esame la funzione renale è stabile si può riprendere la metformina.

Ricordiamo che anche l'AIFA aveva emanato, alcuni anni fa, delle raccomandazioni sull'uso della metformina .

**RenatoRossi**

**Bibliografia**

1. FDA Drug Safety Communication: FDA revises warnings regarding use of the diabetes medicine metformin in certain patients with reduced kidney function.  
<http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM494140.pdf>

2. <http://www.pillole.org/public/aspnuke/news.asp?id=5297>