

La sincope: incidenza, cause e prognosi

30 dicembre 2002 Data Categoria cardiovascolare

Sono stati inclusi in questo studio 7814 adulti, di età media di 66 anni, seguiti per un periodo medio di 17 anni. L'incidenza cumulativa di sincope a 10 anni è stata del 6%. Tra i 727 pazienti che riportarono episodi sincopali, il 78%

presentò un episodio e il 22% due o più episodi. Fra le cause più comuni: fattori vasovagali (21%), cardiopatie (10%), ortostasi (9%) e farmaci (7%). Nel 37% dei pazienti le cause rimasero sconosciute. A confronto dei pazienti che non riportarono episodi sincopali, quelli affetti da sincope di origine cardiologica presentarono un incremento di 2 voltenella mortalità per tutte le cause e un incremento di circa 3 volte del rischio di andare incontro ad infarto o morte per causa coronarica.

I soggetti con sincope di origine sconosciuta presentarono un incremento del 32% nella mortalità per tutte le cause e un 31% di incremento del rischio per infarto miocardico o morte per causa coronarica.

I pazienti con sindrome da causa vasovagale, ortostatica o indotta da farmaci non presentarono aumento del rischio di morte o di infarto.

N Engl J Med 2002 Sep 19; 347: 878-85