



## Diabete e anemia

**Data** 27 luglio 2025  
**Categoria** metabolismo

Esiste un'associazione forte tra diabete e vari tipi di anemia ma i meccanismi sottostanti sono ancora poco compresi.

Il diabete può essere associato a diversi tipi di anemia. Alcuni ricercatori hanno indagato questo fenomeno valutando l'influenza di fattori come l'infiammazione, la disfunzione renale e l'uso di farmaci. Sono stati analizzati i dati di 9.026 partecipanti dal NHANES e 389.616 dalla UK Biobank, concentrandosi su individui bianchi di età compresa tra 40 e 69 anni.H

Le persone con diabete diagnosticato avevano probabilità da due a quattro volte superiori di presentare anemia rispetto a quelle con glicemia normale. Durante un follow-up mediano di 13,6 anni nella UK Biobank, 42.354 individui hanno sviluppato anemia. I rapporti di rischio erano: 3,05 (IC 95%: 2,90-3,21) per l'anemia da carenza di ferro, 3,02 (IC 95%: 2,51-3,63) per l'anemia da malattia cronica, 4,88 (IC 95%: 4,23-5,63) per l'anemia da carenza di vitamina B12.

Anche dopo aver aggiustato i dati per alcuni fattori (infiammazione, disfunzione renale e uso di farmaci) le associazioni tra diabete e anemia rimanevano forti e statisticamente significative.

Gli autori sottolineano la necessità di ulteriori ricerche per comprendere i meccanismi sottostanti e per sviluppare strategie di prevenzione e trattamento mirate.

### Che dire?

Questo studio evidenzia un legame solido e statisticamente rilevante tra il diabete e diversi tipi di anemia. L'uso di due grandi coorti internazionali – NHANES e UK Biobank – conferisce robustezza ai risultati, grazie alla diversità e alla dimensione del campione analizzato. L'associazione tra diabete e anemia persiste anche dopo l'aggiustamento per fattori notoriamente correlati come infiammazione, malattia renale cronica e farmaci. Questo suggerisce che potrebbero esistere meccanismi fisiopatologici ancora poco compresi attraverso cui il diabete promuove l'anemia, indipendentemente dalle complicanze tradizionali.

Dal punto di vista pratico il messaggio take away è questo: è necessario monitorare i parametri ematologici nei pazienti diabetici, anche in assenza di segni evidenti di nefropatia o infiammazione: riconoscere precocemente i segni di anemia potrebbe migliorare la gestione complessiva del paziente e ridurre complicanze a lungo termine.

### Renato Rossi

### Bibliografia

Li, M., Ruhl, A. P., Grams, M. E., Lutsey, P. L., & Selvin, E. (2025). Association Between Diabetes and Anemia: Evidence From NHANES and the UK Biobank. *Diabetes Care*, 47(5), 715–724. <https://doi.org/10.2337/dc23-1997>.