

## IIEF 5

Data30 giugno 2000Categoriaandrologia

(Questionario per la valutazione del defici erettile. Appendice all' articolo riportato nelle Pillole)

Domanda

 - Quanto spesso e' stato capace di avere un' erezione durante l' attivita' sessuale?
R.

0: non ho avuto nessuna attivita'

1:quasi mai o mai

2: poche volte (meno della meta')

3:qualche volta(meta' delle volte)

4:la maggioranza delle volte

5:sempre o quasi

Dopo lo stimolo sessuale ha raggiunto un'erezione sufficiente per la penetrazione?

0:nessuna attivita & #8217; sessuale

1 quasi mai o mai

2poche volte (meno della meta')

3: qualche volta (meta' delle volte)

4: la maggioranza delle volte

5:sempre o quasi

Quando ha tentato un approccio sessuale, quanto spesso e' stato capace di penetrare la sua partner?

0: non ho tentato nessun approccio

1: quasi mai o mai

2: poche volte (meno della meta')

3:qualche volta (meta' delle volte)

4:la maggioranza delle volte

5: sempre o quasi

Durante il rapporto sessuale quanto spesso e' stato capace di mantenere l'erezione dopo che ha penetrato la partner?

0:non ho tentato nessun approccio

1: quasi mai o mai

2:poche volte (meno della meta')

3: qualche volta (meta' delle volte)

4: la maggioranza delle volte

5:sempre o quasi

Durante il rapporto sessuale quanto difficile e' stato mantenere l'erezione fino alla fine del rapporto?

0:non ho tentato nessun approccio

1:estremamente difficile

2:molto difficile

3:difficile

4:un po' difficile

5: non difficile

Come valuterebbe il suo livello di fiducia per poter raggiungere e mantenere un'erezione?

1: molto bassa

2:bassa

3:modesta

4:alta

5: molto alta

-----

Allegato 2.: Domande aggiuntive sulla disfunzione erettile.

Ha erezioni spontanee al risveglio?



Ha osservato noduli o parti indurite toccando il pene? L'erezione si accompagna a dolore o incurvamento? ("Il Diabete" vol.12 n.1 Marzo 2000)