IIEF 5

Data 30 giugno 2000
Categoria andrologia

(Questionario per la valutazione del defici erettile. Appendice all' articolo riportato nelle Pillole)

Domanda
- Quanto spesso e’ stato capace
di avere un’erezione durante l’attivita’ sessuale?
R.

0: non ho avuto nessuna attivita’

1:quasi mai o mai
2: poche volte (meno della meta’)
3:qualche volta(meta’ delle volte)
4:la maggioranza delle volte
5:sempre o quasi

Dopo lo stimolo sessuale ha raggiunto un’erezione sufficiente per la penetrazione?

0:nessuna attivita’ sessuale
1 quasi mai o mai
2poche volte (meno della meta’)
3: qualche volta (meta’ delle volte)
4: la maggioranza delle volte
5:sempre o quasi

Quando ha tentato un approccio sessuale, quanto spesso e’ stato capace di penetrare la sua partner?
0: non ho tentato nessun approccio
1: quasi mai o mai
2: poche volte (meno della meta’)
3:qualche volta (meta’ delle volte)
4:la maggioranza delle volte
5: sempre o quasi

Durante il rapporto sessuale quanto spesso e’ stato capace di mantenere l’erezione dopo che ha penetrato la partner?
0:non ho tentato nessun approccio
1: quasi mai o mai
2:poche volte (meno della meta’)
3: qualche volta (meta’ delle volte)
4: la maggioranza delle volte
5:sempre o quasi

Durante il rapporto sessuale quanto difficile e’ stato mantenere l’erezione fino alla fine del rapporto?
0:non ho tentato nessun approccio
1:estremamente difficile
2:molto difficile
3:difficile
4:un po’ difficile
5: non difficile

Come valuterebbe il suo livello di fiducia per poter raggiungere e mantenere un’erezione?
1: molto bassa
2:bassa
3:modesta
4:alta
5: molto alta

Allegato 2.: Domande aggiuntive sulla disfunzione erettile.

Ha erezioni spontanee al risveglio?

Ha osservato noduli o parti indurite toccando il pene?
L’erezione si accompagna a dolore o incurvamento?
("Il Diabete" vol.12 n.1 Marzo 2000)