



IIEF 5

Data 30 giugno 2000
Categoria andrologia

(Questionario per la valutazione del defici erettile. Appendice all' articolo riportato nelle Pillole)

Domanda

- Quanto spesso e’ stato capace di avere un’erezione durante l’attivit’ sessuale?
R.

0: non ho avuto nessuna attivita’

- 1:quasi mai o mai
- 2: poche volte (meno della meta’)
- 3:qualche volta(meta’ delle volte)
- 4:la maggioranza delle volte
- 5:sempre o quasi

Dopo lo stimolo sessuale ha raggiunto un’erezione sufficiente per la penetrazione?

- 0:nessuna attivita’ sessuale
- 1 quasi mai o mai
- 2poche volte (meno della meta’)
- 3: qualche volta (meta’ delle volte)
- 4: la maggioranza delle volte
- 5:sempre o quasi

Quando ha tentato un approccio sessuale, quanto spesso e’ stato capace di penetrare la sua partner?

- 0: non ho tentato nessun approccio
- 1: quasi mai o mai
- 2: poche volte (meno della meta’)
- 3: qualche volta (meta’ delle volte)
- 4:la maggioranza delle volte
- 5: sempre o quasi

Durante il rapporto sessuale quanto spesso e’ stato capace di mantenere l’erezione dopo che ha penetrato la partner?

- 0:non ho tentato nessun approccio
- 1: quasi mai o mai
- 2:poche volte (meno della meta’)
- 3: qualche volta (meta’ delle volte)
- 4: la maggioranza delle volte
- 5:sempre o quasi

Durante il rapporto sessuale quanto difficile e’ stato mantenere l’erezione fino alla fine del rapporto?

- 0:non ho tentato nessun approccio
- 1:estremamente difficile
- 2:molto difficile
- 3:difficile
- 4:un po’ difficile
- 5: non difficile

Come valuterebbe il suo livello di fiducia per poter raggiungere e mantenere un’erezione?

- 1: molto bassa
- 2:bassa
- 3:modesta
- 4:alta
- 5: molto alta

Allegato 2.: Domande aggiuntive sulla disfunzione erettile.

Ha erezioni spontanee al risveglio?



Ha osservato noduli o parti indurite toccando il pene?
L'erezione si accompagna a dolore o incurvamento?
("Il Diabete" vol.12 n.1 Marzo 2000)